Angriffsstrategien

pflanzenparasitärer Nematoden im Kartoffelbau

www.freudenberger.net

WANDERNDE WURZELNEMATODEN
Trichodoriden



Einfluss von Zwischenfrüchten:
Sandhafer: unklar
Resistenter Ölrettich: Reduktion TRV, (Vermehrung Trichodoriden)
Tagetes: natürliche Abnahme

Empfehlung:
Ölrettich TORO

WURZELGALLEN-NEMATODE
Meloidogyne chitwoodii



Einfluss von Zwischenfrüchten:
Resistenter Ölrettich: aktive Reduktion
Sandhafer: Vermehrer
Tagetes: natürliche Abnahme

Empfehlung:
Ölrettich FARMER, ATLANTIS, DOUBLEMAX



WURZELNEMATODEN
Pratylenchus penetrans



Einfluss von Zwischenfrüchten:
Ölrettich: Vermehrer
Sandhafer: natürliche Abnahme
Tagetes: aktive Reduktion

Empfehlung:
Tagetes patula LABYRINTH

GELBE UND WEISSE ZYSTENNEMATODEN
Globodera rostochiensis
Globodera pallida



Einfluss von Zwischenfrüchten:
Kein Einfluss durch Zwischenfrüchte bekannt

Empfehlung:
Keine besonderen Empfehlungen