



www.freudenberger.net

Sorte Einj. Weidelgras	Zwischenfruchtanbau							Hauptfruchtanbau		
	Ploidie	Ährenschieben (Reifegruppe)	Massebildung im Anfang	Neigung zu Lager	Anfälligkeit für Rost	Anfälligkeit für Mehltau	TM-Ertrag 1. Schnitt	Massebildung im Anfang	Gesamt	1. Schnitt
BIGBANG*	t	2 (sehr früh bis früh)	7	5	5	4	7	-	-	-
ANDREA*	d	2 (früh)	5	4	3	5	5	3	6	4
AUBADE*	t	5 (mittel)	6	5	6	-	5	5	4	6
LEMNOS	t	4 ¹ (früh bis mittel)	-	-	-	-	-	6	6	6
MENDOZA	d	4 (früh bis mittel)	-	-	-	-	-	6	6	5
MELJUMP	t	6 (mittel bis spät)	6	5	4	-	5	5	7	4
MELWORLD	d	6 (mittel bis spät)	5	-	5	-	4	5	7	4

¹ zeigen im Zwischenfruchtanbau keine Blütenstandsbi-
 Quelle: Bundessortenamt, Beschreibende Sortenliste, Stand 2024

 *besonders gut* *züchtereigene Einstufung

Ausführliche Legende S. 108